

KIEDY DO ORTODONTY?

Najlepiej pomiędzy trzecimi a czwartymi urodzinami dziecka, kiedy ma już wszystkie zęby mleczne. Wtedy lekarz będzie mógł ocenić, czy dziecko nie ma wady zgryzu.

Gdy zostanie wcześniej dostrzeżona, łatwiej będzie ją skorygować. W około 80% wady zgryzu powstają w pierwszych latach życia. Nie czekajmy aż pojawią się zęby stałe u dzieci, bo może się okazać, że leczenie ortodontyczne stanie się bardziej skomplikowane i będzie wymagać dłuższej terapii i leczenia.

Objawy wskazujące na potrzebę konsultacji ortodontycznej:

- asymetria w rysach twarzy dziecka,
- oddychanie ustami i stale otwarta buzia,
- złe i szkodliwe nawyki takie jak: obgryzanie paznokci, ołówków, ssanie smoczka,
- różne wady wymowy,
- dysfunkcja języka,
- przedwczesna utrata zębów mlecznych (próchnica),
- nadmiernie cofnięta lub wysunięta bródka,
- nieprawidłowe uszeregowanie zębów: szpary między zębami lub nadmierne stłoczenia,
- kiedy dziecko powyżej 3 roku życia nie chce gryźć twardych pokarmów, zbyt późne wypadanie zębów mlecznych,
- zęby wyrżnięte w niewłaściwym miejscu,
- zbyt głębokie lub zbyt płytkie nagryzanie zębów górnych na dolne,
- odwrotny nagryz w zakresie zębów przednich,

Zaniechanie leczenia ortodontycznego może być przyczyną wielu powikłań w obrębie narządu żucia, takich jak:

- nasilenia próchnicy
- zaburzeń mowy
- zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych
- paradontozy
- starcia zębów
- nadwrażliwości zębów
- przedwczesnej utraty.

